

FICHA TÉCNICA


TRASLATE

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora : FARMAGRO S.A.
Titular de Registro : FARMAGRO S.A.
Número de Registro : PQUA N° 1114-SENASA

IDENTIDAD

Composición : Fosetil aluminio
Concentración : 800 g/kg
Formulación : Polvo Mojable
Grupo químico : Organofosfonato
Clase de Uso : Fungicida
Fórmula empírica : C₆H₁₈AlO₉P₃
Fórmula estructural :



CARACTERÍSTICAS

TRASLATE es un fungicida ampliamente utilizado para el tratamiento de enfermedades causadas por hongos Oomicetos, en particular Mildiu, Phytophthora y Pythium. Además, estimula los mecanismos naturales de defensa de la planta, minimizando la posibilidad de aparición de cepas resistentes.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Densidad Relativa : No aplica
pH : 3.0 – 5.0
Estado Físico : Sólido
Color : Blanco
Olor : Insignificante
Estabilidad en Almacenamiento : Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.
Explosividad : No explosivo
Corrosividad : No corrosivo

MODO DE ACCIÓN

TRASLATE tiene actividad sistémica completa: Ascendente y descendente, una rápida penetración y acción preventiva y curativa.

MECANISMO DE ACCIÓN

TRASLATE, actúa inhibiendo la germinación de esporas, bloquea el desarrollo del micelio y la esporulación. También actúa incrementando los mecanismos de defensa natural de la planta (fitoalexinas) frente a posibles ataques de enfermedades.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L	Kg/ha		
Cebolla	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>	0.75	-	14	50
Pimiento	Pudrición radicular	<i>Phytophthora capsici</i>	-	1.5	3	130
Palto	Pudrición radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.5	-	14	50
Mandarina	Marchitez	<i>Phytophthora parasitica</i>	0.75	-	15	80

P.C: Última aplicación a la cosecha (días).

L.M.R: Límite Máximo de Residuos (mg/kg).

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar un riego antes de la aplicación, realizar como máximo 1 aplicación por campaña/año.

COMPATIBILIDAD

TRASLATE no es compatible con agentes oxidantes.

REINGRESO A UN ÁREA TRATADA

No ingresar a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

TRASLATE no es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Ligeramente Peligroso.

Rev. 24-12-24