

## FICHA TÉCNICA SUPER MAGNESIO

### DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora : FARMAGRO S.A

### IDENTIDAD

Composición:	Magnesio (Mg)	4.0%
	Zinc (Zn)	0.5%
	Cobre (Cu)	0.02%
	Extractos húmicos	2.0 g/l
	Ácidos carboxílicos	40.0 g/l
Formulación:	Concentrado soluble	
Clase de uso:	Nutriente foliar	

### CARACTERÍSTICAS

**SUPER MAGNESIO** es un bionutriente líquido a base de ácidos carboxílicos, ácidos húmicos, magnesio, zinc y cobre, totalmente quelatados y altamente asimilables por las plantas. Es ideal para corregir las deficiencias de Mg, un elemento que participa en la fotosíntesis.

**SUPER MAGNESIO** tiene en su composición un gran contenido de ácidos carboxílicos, lo que permite que los elementos contenidos en esta formulación se transporten eficazmente y lleguen a los puntos de demanda, corrigiendo las deficiencias y mejorando su asimilación en toda la planta.

### PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

Densidad Específica	: 1200 g/L
pH	: 6.0
Estado Físico	: Líquido
Color	: Celeste verdoso
Olor	: Ligeramente inodoro
Estabilidad en Almacenamiento	: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

## RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN	OBSERVACIONES
	200 L	Ha.		
Alfalfa, Cebada, Trigo, Arroz	1 L	2 L	Aplicar 1 a 2 semanas antes de la floración.	Combinarlo con VITAL-W más MULTIFRUT.
Melocotonero, Manzanas y Peras	1 L	2 L	<b>1ra. Aplicación:</b> Antes de la floración. <b>2da. Aplicación:</b> A la caída de los pétalos. <b>3ra. Aplicación:</b> Cuatro semanas después de la caída de los pétalos.	La primera aplicación combinarlo con MIXHOR-PLUS más MULTIFRUT y ZIFERMAN-L. La segunda aplicación combinarlo con MIXHOR-PLUS más FRUTIMAX más HARD-TOG. La tercera aplicación combinarlo con MIXHOR-PLUS más HARD-TOG más ZIFERMAN-L.
Paltas	1 L	2 L - 3 L	Antes y después de la floración.	Combinarlo con FRUTIMAX más ZIFERMAN-L. Después del cuajado aplicarlo con HARD-TOG.
Frijol, Vainita, Arveja	1 L	2 L	<b>1ra. Aplicación:</b> Aplicar justo cuando recién han cuajado las vainas. <b>2da. Aplicación:</b> Dos semanas después.	Combinarlo con MULTIFRUT más MIXHOR-PLUS más HARD-TOG para ambas aplicaciones.
Papa, Zanahoria	1 L	2 L	<b>1ra. Aplicación:</b> Cuando las plantas tengan de 4 a 6 semanas de edad. <b>2da. Aplicación:</b> Dos semanas después. <b>3ra. y otras aplicaciones</b> con intervalos de 3 a 4 semanas.	Primera y Segunda Aplicación combinarlos con MIXHOR-PLUS más MULTIFRUT. Tercera aplicación y otras combinando con MIXHOR-PLUS más ZIFERMAN-L con MULTIFRUT.
Apio, Lechuga, Espinaca	1 L	2 L	De 1 a 4 aplicaciones cada 10 a 15 días de intervalo.	Combinarlo con NITROMAX más ZIFERMAN-L.
Col, Coliflor, Brócoli	1 L	2 L	Dos o más aplicaciones cada 10 a 15 días de intervalo.	Combinarlo con VITAL-W más MULTIFRUT.
Cítricos	1 L	3 L - 4 L	1ra. Aplicación antes de la floración. 2da. Aplicación cuando aparecen los nuevos brotes.	Ambas aplicaciones combinarlas con ZIFERMAN-L más HARD-TOG.
Algodón	1 L	2 L	1ra. Aplicación antes de la floración. 2da. Aplicación inmediatamente después del cuajado. 3ra. Aplicación 10 a 15 días después de la segunda.	Combinarlo con MIXHOR PLUS más MULTIFRUT. La segunda y tercera aplicación combinarlo con MIXHOR PLUS más HARD-TOG más MULTIFRUT.
Vid	1 L	2 L	1ra. Aplicación antes de la floración. 2da. y 3ra. Aplicación después de la floración.	Primera aplicación combinarlo con MIXHOR PLUS más MULTIFRUT. 2da. y 3ra. Aplicación combinarlo con MIXHOR PLUS más MULTIFRUT más HARD-TOG.
Zapallo, Sandía, Pepinillo, Melón	1 L	2 L	1ra. Aplicación al inicio de la floración. Continuando las aplicaciones cada 2 a 3 semanas.	Combinarlo con MULTIFRUT más ZIFERMAN-L.
Cebolla, Ajo, Poro	1 L	2 L	1ra. Aplicación hacerla 4 a 6 semanas antes de la formación de los bulbos. 2da. Aplicación dos semanas después. 3ra. Aplicación al momento de la formación de los bulbos.	Primera y segunda aplicación combinarlo con MIXHOR PLUS más MULTIFRUT. Tercera aplicación combinarlo con MIXHOR PLUS más HARD-TOG.
Fresa	1 L	2 L	Hacer una o más aplicaciones antes de la floración y continuarlas durante el periodo de fructificación.	Combinarlo con MULTIFRUT más HARD-TOG alternándolas con MULTIFRUT más ZIFERMAN-L.
Maíz, Choclo	1 L	2 L	Aplicarlo recién formada la mazorquita.	Combinarlo con MIXHOR PLUS, MULTIFRUT y HARD-TOG.

Tomate, Pimiento, Ají, Paprika	1 L	2 L	Aplicarlo cada 10 a 15 días.	Antes de la floración combinarlo con MIXHOR PLUS más MULTIFRUT. Después de la floración combinar MIXHOR PLUS más HARD-TOG más MULTIFRUT.
Café	1 L	2 L - 3 L	1ra. Aplicación antes de la floración. 2da. Aplicación cuando se está formando el cerezo.	Combinarlo con MULTIFRUT.

### **CONDICIONES DE APLICACIÓN**

**SUPER MAGNESIO** debe aplicarse en la etapa de pleno crecimiento de los cultivos a fin de reforzar la capacidad fotosintética de los mismos.

### **REINGRESO AL ÁREA TRATADA**

Se recomienda no ingresar a las áreas tratadas hasta 4 horas después de la aplicación.

### **FITOTOXICIDAD**

**SUPER MAGNESIO** no es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

### **CATEGORIA TOXICOLÓGICA**

Ligeramente Peligroso.

Rev. 06-01-26