

FICHA TÉCNICA

FOLIGUARD SC

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora : FARMAGRO S.A.
Titular de Registro : FARMAGRO S.A.
Número de Registro : PBUA N° 159-SENASA

IDENTIDAD

Composición : *Trichoderma harzianum*
Concentración : Cada mililitro contiene 5×10^8 de conidiósporas viables
Formulación : Suspensión concentrada (SC)
Clase de Uso : Fungicida Biológico

CARACTERÍSTICAS

La cepa de **Trichoderma harzianum** DSM 14944, ingrediente activo del producto **FOLIGUARD SC**, es una cepa mejorada y estable en su actividad biológica. Está debidamente formulada como suspensión concentrada para garantizar su alto desempeño.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Densidad Relativa : Aprox. 0.965 g/L
pH : 6.4
Estado Físico : Líquido
Color : Violeta característico
Olor : Ligeramente a aceite
Estabilidad en Almacenamiento : Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.
Explosividad : No explosivo
Corrosividad : No corrosivo

MODO DE ACCIÓN

FOLIGUARD SC actúa por competencia y antagonismo.

MECANISMO DE ACCIÓN

FOLIGUARD SC, actúa inhibiendo la germinación de las esporas y el crecimiento de los microorganismos fitopatógenos, disminuyendo la incidencia y la severidad de la enfermedad. **FOLIGUARD SC** proporciona una protección prolongada, desde el campo hasta la postcosecha.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	ml/200L	ml/ha		
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	200	-	N. A	N. A
Espárrago	Mancha púrpura	<i>Stemphylium versicarium</i>	200	-	N. A	N. A
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	-	750	N. A	N. A
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200 - 300	-	N. A	N. A
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	250 - 300	-	N. A	N. A
Palto	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200 - 300	-	N. A	N. A
Cebolla	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	200 - 250	-	N. A	N. A
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	-	N. A	N. A

P.C: Periodo de carencia.

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

N.A: No aplica

CONDICIONES DE APLICACIÓN

FOLIGUARD SC es un producto fungicida cuya aplicación debe dirigirse hacia el haz y el envés de las hojas, así como hacia las flores y los frutos; estos son los sitios donde se origina y desarrolla la enfermedad. El tipo de boquilla adecuada para aplicaciones en flor, fruto y follaje debe ser de baja descarga, alta nebulización y turbulencia. La aplicación debe garantizar un perfecto cubrimiento, es decir, un alto número de microgotas por unidad de área.

FOLIGUARD SC debe aplicarse siempre al inicio de la enfermedad, o preferiblemente de forma preventiva.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

FOLIGUARD SC se utiliza en dosis de 0.5 a 1 ml de producto por litro de mezcla de aplicación. Primero, coloque parte del volumen de agua y luego agregue el producto en la medida correspondiente a la aplicación que vaya a realizar. Enjuague los recipientes que hayan estado en contacto con el producto, vertiendo el enjuague sobre la mezcla a aplicar. Mezcle muy bien. Agregue el agua restante para ajustar la dosis correcta. Agite de nuevo la mezcla total hasta que quede homogénea y emulsionada. Aplique inmediatamente y no guarde la mezcla para usarla más tarde.

COMPATIBILIDAD

FOLIGUARD SC puede ser usado en programas de Agricultura Orgánica, manejo integrado MIC, en rotación con otros plaguicidas.

REINGRESO A UN ÁREA TRATADA

Se recomienda no ingresar a las áreas tratadas hasta 4 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

FOLIGUARD SC no es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

PRECAUCIÓN.

Rev. 24.11.2025