

FICHA TÉCNICA TOG-K

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora : FARMAGRO S.A
Formulador : VELLAM MATERIAS BIOACTIVAS, S.L.

IDENTIDAD

Composición:	Potasio	135 g/L
	Ácidos carboxílicos	200 g/L
Formulación:	Concentrado soluble	
Clase de uso:	Bioestimulante	

CARACTERÍSTICAS

TOG-K es un bionutriente con ácidos carboxílicos que forma complejos orgánicos con el potasio, actuando como un corrector de carencias. Su empleo previene y corrige estados carenciales de potasio en vid, cítricos, frutales de hueso y pepita, horticolas, así como en cualquier otro cultivo afectado.

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS

Densidad Específica	: 1.14 g/L
pH	: 7.6
Estado Físico	: Líquido
Color	: Marrón oscuro
Olor	: Característico
Estabilidad en Almacenamiento	: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo
Temperatura de inflamación	: > 100°C

CARACTERÍSTICAS

TOG-K contiene en su formulación ácidos carboxílicos de bajo peso molecular, los cuales tienen la particularidad de ser muy reactivos y capaces de enlazar cualquier nutriente para transportarlos dentro del cultivo. Adicionalmente, los tipos de ácidos carboxílicos y el potasio de **TOG K** forman una concentración de reserva metabólica que la planta puede utilizar en situaciones de estrés.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	Dosis (L/Ha)	FORMAS DE APLICACIÓN
Frutales: Uva de mesa, uva para vino y pisquera	2 - 4	2 a 3 aplicaciones
Manzano, fresa	2 - 3	2 a 3 aplicaciones
Melocotón, durazno, maracuyá	2 - 3	2 a 3 aplicaciones
Limón, mandarina, naranja	2 - 3	2 a 3 aplicaciones
Palto	1 - 3	2 a 3 aplicaciones
Mango	2 - 3	2 a 4 aplicaciones
Olivo	2 - 3	2 a 3 aplicaciones
Banano	2 - 3	1 a 2 aplicaciones
Café, cacao, papaya	1 - 2	1 a 2 aplicaciones
Arándano	1 - 2	1 a 2 aplicaciones
Granado	2 - 4	2 a 4 aplicaciones
Hortalizas: Apio, acelga, tomate, lechuga, ají, pimienta, páprika, pepino, sandía, zapallo, brócoli, coliflor, col, papa, cebolla, espárrago, ají, arveja, haba, lenteja, frejol, pallar, alcachofa.	2 - 4	2 a 3 aplicaciones
Otros: Trigo, maíz	1 - 2	1 a 2 aplicaciones
Tabaco	1 - 2	1 a 2 aplicaciones
Arroz, papa	1 - 2	2 a 3 aplicaciones
Caña de azúcar	1.5 - 2	1 a 2 aplicaciones

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar aplicaciones de **TOG-K** varias veces durante el período vegetativo del cultivo.

COMPATIBILIDAD

TOG-K es compatible con la mayoría de los fungicidas, insecticidas y herbicidas de uso común. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de su aplicación.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA

Se recomienda no ingresar a las áreas tratadas hasta 4 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

TOG-K no es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Ligeramente Peligroso.

Rev. 13-05-25