

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL
 ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

- Procurarse las instrucciones antes del uso.
- No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
- No respirar polvo/humos/gas/nieblas/ vapores/aerosoles.
- Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
- EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
- Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.
- P405 Guardar bajo llave.
- P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Antídoto: Vitamina K1 (fitomenadiona BP).

TELÉFONO DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN
SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS:

Toxicidad aguda (oral, dermal): Categoría 5
 Toxicidad para la reproducción: Categoría 1
 Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras exposiciones repetidas: Categoría 2

INDICACIONES DE PELIGRO:

- Puede ser nocivo en caso de Ingestión.
- Puede ser nocivo en contacto con la piel.
- Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- Puede provocar daños en los órganos (sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

RATA FIN[®]

PELLETS

RODENTICIDA

USO DOMÉSTICO, INDUSTRIAL Y EN SALUD PÚBLICA

CEBO LISTO PARA USAR EN PELLETS

Composición:

Brodifacoum 0.005 %
 Aditivos 99.995%

N°XXXX -2024/DCEA/DIGESA/SA



TITULAR, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:
FARMAGRO S.A.
 Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)
 Z.I. Huachipa Este. San Antonio - Huarochiri, Lima.
 Central: (01) 614 1500




FABRICANTE:
UNICHEM d.o.o.
 Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika, Eslovenia

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido Neto:
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



INFORMACIÓN GENERAL

RATA FIN Pellets es un cebo rodenticida en pellets, listo para su uso. Es un anticoagulante de segunda generación que controla eficazmente ratas y ratones.

RATA FIN Pellets contiene una mezcla de ingredientes de grado alimenticio de alta calidad, rico en calorías y energía, altamente atractivo para los roedores.

RATA FIN Pellets se recomienda principalmente en interiores, aunque también se usa con éxito en exteriores protegido de la humedad. Es especialmente adecuado para lugares secos, como almacenes de alimentos, además de en establecimientos como viviendas, departamentos, locales comerciales, centros comunitarios, hospitales, hoteles, plantas de proceso, restaurantes, almacenes industriales y fábricas, colocándolo sobre superficies que no entren en contacto con los alimentos.

Contienen un agente aversivo (amargante) que hace que el cebo sea más seguro para humanos y mascotas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Colocar **RATA FIN Pellets** tan pronto se observen signos de actividad tales como excrementos frescos, cerca de madrigueras y rutas de paso. Establecer puntos de **RATA FIN Pellets** de hasta 10-60 gramos por cebadero, como portacebos o tubos de PVC. Verificar el consumo del cebo con regularidad y reemplazar el cebo gastado o disperso hasta que se detenga el consumo. Revisar los cebos al menos una vez cada dos o tres días al comienzo del tratamiento y posteriormente, como mínimo, una vez a la semana, para comprobar la aceptación del cebo y para retirar los roedores muertos. Colocar más cebos cuando sea necesario. Para reducir el riesgo de envenenamiento secundario, buscar y retirar los roedores muertos durante el tratamiento, como mínimo siempre que se revisen los cebos. El uso de este producto debería eliminar los roedores en un plazo de 35 días.

CUADRO DE USOS:

PLAGA		DOSIS Y RECOMENDACIÓN
Nombre común	Nombre científico	
Rata negra	<i>Rattus rattus</i>	10 - 60 gramos de cebo cada 10 metros para baja infestación y cada 5 metros para alta infestación.
Rata gris o de alcantarilla	<i>Rattus norvegicus</i>	10 - 60 gramos de cebo cada 10 metros para baja infestación y cada 5 metros para alta infestación.
Ratón doméstico	<i>Mus musculus</i>	10 - 20 gramos de cebo cada 5 metros para baja infestación y cada 2 metros para alta infestación.

Tiempo de acción: muerte de los roedores a partir del 4to día.

