

Etiqueta REGALIA MAXX x 1L 28.7 x 14.5cm Enviada por FMC 16.03.23

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No fumar, comer, ni beber durante la mezcla y aplicación de este producto.
- Usar ropa protectora durante el manejo y aplicación del producto.
- Después de usar el producto, lave la ropa contaminada y bañarse.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conserva el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Conservar en un lugar seco y en la sombra.
- Lavar las manos antes de comer, beber o fumar.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua por 15-20 minutos, si el contacto fuese directo con la piel, lave inmediatamente con abundante agua.
En caso de ingestión dar a beber agua si la persona la puede ingerir, no inducir el vómito a menos que sea indicado por el médico. No dar nada por la boca a una persona inconsciente. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico conjuntamente con la etiqueta.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

SAMU: 106
CISPROQUIM®: 080-050-847
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido del envase enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

REGALIA MAXX

EXTRACTO VEGETAL
FUNGICIDA AGRÍCOLA
Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Extracto de Reynoutria sachalinensis..... 224.0 g/L
Aditivos.....c.p.s. 1 L

Reg. PBUA N° 0 2 9 8 - SENASA

Titular del Registro: FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas n° 208,
Interior 705-B, Torre III. Urbanización Club Golf los Incas,
Santiago de Surco. Lima, PERÚ



Formulador:

Marrone Bio Innovations Inc.
2121 Second St. Suite B-107, Davis
CA 95618 USA

Importado y distribuido por:

FARMAGRO S.A.
Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)
Z.I. Huachipa Este. San Antonio - Huarochiri, Lima.
Central: (01) 614 1500



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

REGALIA MAXX es un fungicida biológico que contiene el extracto de *Reynoutria sachalinensis* el cual incrementa el sistema natural de defensa de las plantas debido a un aumento de 5 veces en los compuestos fénolicos. Utilice **REGALIA MAXX** como tratamiento preventivo.

Para aplicar este producto no se requiere premezcla, se vacía directamente en el tanque de mezcla definitiva. Debe dispersarse en toda el agua sin que haya asentamientos, por ello es necesario agitar. Este producto se aplica disuelto en agua por aspersión. Se recomienda mojar las hojas y frutos de forma completa y uniforme. Aplique con cualquier equipo de aspersión manual o motorizada manteniendo en forma constante la agitación de la mezcla durante toda la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Nombre de la enfermedad		Dosis L/ha	Dosis L/cil.	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	1.2 - 1.5		N.A.	N.A.
Quinoa	Mildiu	<i>Peronospora farinosa</i>		0.7		
Vid	Mildiu de la vid	<i>Plasmopara viticola</i>	1.2 - 1.5			
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	1.25 - 1.5			
Arándano	Pudrición gris	<i>Botrytis cinerea</i>	1.25			
Palto	Moho negro de las panículas	<i>Cladosporium sp.</i>	0.6 - 3	0.3		

P.C.: Periodo de carencia en días.

L.M.R.: Límite máximo de residuos en p.p.m.

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para Uvas, Quinoa y Pimiento, aplicar el fungicida biológico **REGALIA® MAXX** de manera preventiva o cuando aparezcan síntomas de la enfermedad y/o las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del patógeno. Repetir la aplicación con un intervalo de 7 a 14 días. Máximo 4 aplicaciones por temporada. Palto: Realizar una aplicación antes de que aparezcan los primeros síntomas (preventiva) durante la fase de inicio de floración del cultivo o panícula. Arándano: Aplicar máximo dos (02) aplicaciones por campaña, una (01) campaña al año, algunas variedades pueden mostrar sensibilidad a la aplicación a través de un manchado de fruto, se recomienda hacer una prueba en franja para confirmar que su variedad no es susceptible, no exceda una concentración de 1% v/v. Para lograr una adecuada efectividad en la aplicación, el campo a tratar debe estar bajo rotación de cultivos. Se debe realizar el deshierbe manual. Realice una adecuada disposición de los residuos de poscosecha y tratamiento biológico. Toxicología del producto. La aplicación del producto debe hacerse de forma preventiva, cuando las condiciones del cultivo y medio ambiente sean propicias a la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO: Reingresar una vez que el producto se haya secado.

COMPATIBILIDAD: No pre mezclar **REGALIA MAXX** con otro componente antes de añadir al tanque de aplicación si no se conoce previamente su compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos ni en los frutos en que se recomienda si se emplea la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

NO CORROSIVO NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE



PRECAUCIÓN

