



GENERALIDADES: SILIFARM es un surfactante siliconado que rompe la tensión superficial de las gotas de aspersión de los productos agroquímicos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares, permite mojar completamente la superficie aplicada y da una cobertura total de hojas y frutas, especialmente cuando tienen cubiertas de cera y/o pilosas. Este efecto mejora la eficacia del producto agroquímico aplicado.

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE:

- Puede causar daño por inhalación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajeados.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Puede causar irritación de la piel y los ojos.
- Puede causar sensibilización cutánea por contacto con la piel.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca durante 15 minutos y con los párpados abiertos. En caso de ingestión; lavar inmediatamente la boca, buscar ayuda médica.

NOTA AL MEDICO:

Tratamiento sintomático. En caso de ingestión, administre líquidos en abundancia. Se puede preparar una mezcla suspendiendo 50 gr. de carbón activado en 400 ml. de agua., agitar intensamente y dar de beber al paciente. La dosis estándar es 5 ml/kg/350ml para un adulto promedio.

DL₅₀ oral > 5000 mg/kg
DL₅₀ dermal > 4000 mg/kg.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:
SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500 / CISPROQUIM: 080 050 847

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO

NOTA AL COMPRADOR:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**(Poliéter y silicona)
Concentrado Soluble (SL)**

COMPOSICION QUIMICA:

Ingrediente activo:
Heptametil Trisiloxano 100%

**PENETRANTE Y SURFACTANTE AGRÍCOLA
SILICONADO**

Importador y distribuidor:

FARMAGRO S.A.
Av. Principal 2, Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)
Z.I. Huachipa Este, San Antonio - Huarochiri, Lima.
Central: (01) 614 1500



Fabricante:
ZHEJIANG SEGA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
Room 1311, B unit, Simo International Building, 673 Gudun Road,
Hangzhou, CHINA.

® = Marca registrada de FARMAGRO S.A.

INDICATIVOS DE USO:

SILIFARM actúa disminuyendo la tensión superficial del agua, lo que permite un mojado uniforme al caer la aspersión sobre las hojas y frutos, y asegura una mejor cobertura y distribución del agroquímico que se aplica. Aumenta la capacidad de mojado sobre hojas y frutos que tienen cubierta cerosa.

Modo de empleo:

Preparar la mezcla del agroquímico a las dosis recomendadas en su etiqueta y disolverlo. Cuando el nivel de agua del tanque llegue a ¾ de la capacidad añadir y mezclar **SILIFARM** de acuerdo con las dosis indicadas en el cuadro y llenar el tanque hasta su capacidad.

Nota: Cuando se usa **SILIFARM**, se recomienda disminuir la cantidad de agua a 70-80% del volumen convencional de la aplicación. Si durante la aplicación se observa escurrimiento de agua desde el follaje, se recomienda ajustar nuevamente el volumen de agua.

**CUADRO DE DOSIFICACIONES:
USO ESPECIFICO DEL PRODUCTO**

CLASE DE AGROQUÍMICO	DOSIS DE SILIFARM (mL/cilindro de 200L)
Herbicida	50 a 100 mL
Fungicida - Insecticida	50 mL
Reguladores de crecimiento - Fertilizantes foliares	30 a 100 mL


PERIODO DE CARENIA Y PERIODO DE REINGRESO: No hay restricciones a periodo de carencia, ni periodo de reingreso en caso de **SILIFARM**. Todas las restricciones son para la etiqueta del agroquímico empleado en la mezcla.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Las correspondientes al producto agroquímico, regulador de crecimiento o fertilizante que se va a aplicar

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los agroquímicos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares de uso común. No es compatible con aceites. En caso de duda se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar a gran escala.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxica.

**"Manténgase alejado de las personas, animales,
productos alimenticios y medicinas."**



**LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN**

**"Destruya este envase inmediatamente después
de usar el producto."**



GENERALIDADES: SILIFARM es un surfactante siliconado que rompe la tensión superficial de las gotas de aspersión de los productos agroquímicos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares, permite mojar completamente la superficie aplicada y da una cobertura total de hojas y frutas, especialmente cuando tienen cubiertas de cera y/o pilosas. Este efecto mejora la eficacia del producto agroquímico aplicado.

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE:

- Puede causar daño por inhalación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Puede causar irritación de la piel y los ojos.
- Puede causar sensibilización cutánea por contacto con la piel.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante agua fresca durante 15 minutos y con los párpados abiertos. En caso de ingestión; lavar inmediatamente la boca, buscar ayuda médica.

NOTA AL MEDICO:

Tratamiento sintomático. En caso de ingestión, administre líquidos en abundancia. Se puede preparar una mezcla suspendiendo 50 gr. de carbón activado en 400 ml. de agua., agitar intensamente y dar de beber al paciente. La dosis estándar es 5 ml/kg/350ml para un adulto promedio.

DL₅₀ oral > 5000 mg/kg
DL₅₀ dermal > 4000 mg/kg.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:
SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500 / CISPROQUIM: 080 050 847

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO

NOTA AL COMPRADOR:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**(Poliéter y silicona)
Concentrado Soluble (SL)**

COMPOSICION QUIMICA:

Ingrediente activo:
Heptametil Trisiloxano 100%

**PENETRANTE Y SURFACTANTE AGRÍCOLA
SILICONADO**

Importador y distribuidor:

FARMAGRO S.A.
Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)
Z.I. Huachipa Este. San Antonio - Huarochiri, Lima.
Central: (01) 614 1500

FARMAGRO 
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fabricante:
ZHEJIANG SEGA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
Room 1311, B unit, Simo International Building, 673 Gudun Road,
Hangzhou, CHINA.

® = Marca registrada de FARMAGRO S.A.

INDICATIVOS DE USO:

SILIFARM actúa disminuyendo la tensión superficial del agua, lo que permite un mojado uniforme al caer la aspersión sobre las hojas y frutos, y asegura una mejor cobertura y distribución del agroquímico que se aplica. Aumenta la capacidad de mojado sobre hojas y frutos que tienen cubierta cerosa.

Modo de empleo:

Preparar la mezcla del agroquímico a las dosis recomendadas en su etiqueta y disolverlo. Cuando el nivel de agua del tanque llegue a ¼ de la capacidad añadir y mezclar **SILIFARM** de acuerdo con las dosis indicadas en el cuadro y llenar el tanque hasta su capacidad.

Nota: Cuando se usa **SILIFARM**, se recomienda disminuir la cantidad de agua a 70-80% del volumen convencional de la aplicación. Si durante la aplicación se observa escurrimiento de agua desde el follaje, se recomienda ajustar nuevamente el volumen de agua.

**CUADRO DE DOSIFICACIONES:
USO ESPECÍFICO DEL PRODUCTO**

CLASE DE AGROQUÍMICO	DOSIS DE SILIFARM (mL/cilindro de 200L)
Herbicida	50 a 100 mL
Fungicida - Insecticida	50 mL
Reguladores de crecimiento - Fertilizantes foliares	30 a 100 mL

PERIODO DE CARENIA Y PERIODO DE REINGRESO: No hay restricciones a periodo de carencia, ni periodo de reingreso en caso de **SILIFARM**. Todas las restricciones son para la etiqueta del agroquímico empleado en la mezcla.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Las correspondientes al producto agroquímico, regulador de crecimiento o fertilizante que se va a aplicar

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los agroquímicos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares de uso común. No es compatible con aceites. En caso de duda se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar a gran escala.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxica.

**"Manténgase alejado de las personas, animales,
productos alimenticios y medicinas."**



**LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN**

**"Destruya este envase inmediatamente después
de usar el producto."**

