

FICHA TÉCNICA

VITAL-W MAGNESIO

DATOS DE LA EMPRESA

Fabricado y distribuido por : FARMAGRO S.A

IDENTIDAD

Composición:	Magnesio (Mg)	4.0%
	Zinc (Zn)	0.5%
	Cobre (Cu)	0.02%
	Extractos húmicos	2.0 g/l
	Ácidos carboxílicos	40.0 g/l
Formulación:	Concentrado soluble	
Clase de uso:	Fertilizante foliar	

CARACTERÍSTICAS

VITAL-W MAGNESIO es un Bionutriente líquido a base de Ácidos carboxílicos, Ácidos húmicos, Magnesio (Mg), zinc (Zn) y cobre (Cu), altamente asimilable por las plantas, totalmente quelatizado; ideal para corregir la deficiencia de Magnesio (Mg); elemento principal en los procesos fotosintéticos.

VITAL-W MAGNESIO tiene en su composición un gran contenido de Ácidos Carboxílicos lo que hace que los elementos contenidos en esta formulación se transporten muy eficazmente y llegue hacia los puntos de demanda corrigiendo la deficiencia y mejorando su asimilación hacia toda la planta.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Densidad Específica	: 1177 ± 10.0 g/L
pH	: 5.7 ± 1
Estado Físico	: Líquido
Color	: Marrón claro
Olor	: Ligeramente inodoro
Estabilidad en Almacenamiento	: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.
Explosividad	: No explosivo
Corrosividad	: No corrosivo

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN	OBSERVACIONES
	200 L	Ha.		
Alfalfa, Cebada, Trigo, Arroz	1 L	2 L	Aplicar 1 a 2 semanas antes de la floración.	Combinarlo con VITAL-W más MULTIFRUT.
Melocotonero, Manzanas y Peras	1 L	2 L	1ra. Aplicación: Antes de la floración. 2da. Aplicación: A la caída de los pétalos. 3ra. Aplicación: Cuatro semanas después de la caída de los pétalos.	La primera aplicación combinarlo con MIXHOR-PLUS más MULTIFRUT y ZIFERMAN-L. La segunda aplicación combinarlo con MIXHOR-PLUS más FRUTIMAX más HARD-TOG. La tercera aplicación combinarlo con MIXHOR-PLUS más HARD-TOG más ZIFERMAN-L.
Paltas	1 L	2 L - 3 L	Antes y después de la floración.	Combinarlo con FRUTIMAX más ZIFERMAN-L. Después del cuajado aplicarlo con HARD-TOG.
Frijol, Vainita, Arveja	1 L	2 L	1ra. Aplicación: Aplicar justo cuando recién han cuajado las vainas. 2da. Aplicación: Dos semanas después.	Combinarlo con MULTIFRUT más MIXHOR-PLUS más HARD-TOG para ambas aplicaciones.
Papa, Zanahoria	1 L	2 L	1ra. Aplicación: Cuando las plantas tengan de 4 a 6 semanas de edad. 2da. Aplicación: Dos semanas después. 3ra. y otras aplicaciones con intervalos de 3 a 4 semanas.	Primera y Segunda Aplicación combinarlos con MIXHOR-PLUS más MULTIFRUT. Tercera aplicación y otras combinando con MIXHOR-PLUS más ZIFERMAN-L con MULTIFRUT.
Apio, Lechuga, Espinaca	1 L	2 L	De 1 a 4 aplicaciones cada 10 a 15 días de intervalo.	Combinarlo con NITROMAX más ZIFERMAN-L.
Col, Coliflor, Brócoli	1 L	2 L	Dos o más aplicaciones cada 10 a 15 días de intervalo.	Combinarlo con VITAL-W más MULTIFRUT.
Cítricos	1 L	3 L - 4 L	1ra. Aplicación antes de la floración. 2da. Aplicación cuando aparecen los nuevos brotes.	Ambas aplicaciones combinarlas con ZIFERMAN-L más HARD-TOG.
Algodón	1 L	2 L	1ra. Aplicación antes de la floración. 2da. Aplicación inmediatamente después del cuajado. 3ra. Aplicación 10 a 15 días después de la segunda.	Combinarlo con MIXHOR PLUS más MULTIFRUT. La segunda y tercera aplicación combinarlo con MIXHOR PLUS más HARD-TOG más MULTIFRUT.
Vid	1 L	2 L	1ra. Aplicación antes de la floración. 2da. y 3ra. Aplicación después de la floración.	Primera aplicación combinarlo con MIXHOR PLUS más MULTIFRUT. 2da. y 3ra. Aplicación combinarlo con MIXHOR PLUS más MULTIFRUT más HARD-TOG.
Zapallo, Sandía, Pepinillo, Melón	1 L	2 L	1ra. Aplicación al inicio de la floración. Continuando las aplicaciones cada 2 a 3 semanas.	Combinarlo con MULTIFRUT más ZIFERMAN-L.
Cebolla, Ajo, Poro	1 L	2 L	1ra. Aplicación hacerla 4 a 6 semanas antes de la formación de los bulbos. 2da. Aplicación dos semanas después. 3ra. Aplicación al momento de la formación de los bulbos.	Primera y segunda aplicación combinarlo con MIXHOR PLUS más MULTIFRUT. Tercera aplicación combinarlo con MIXHOR PLUS más HARD-TOG.
Fresa	1 L	2 L	Hacer una o más aplicaciones antes de la floración y continuarlas durante el periodo de fructificación.	Combinarlo con MULTIFRUT más HARD-TOG alternándolas con MULTIFRUT más ZIFERMAN-L.
Maíz, Choclo	1 L	2 L	Aplicarlo recién formada la mazorquita.	Combinarlo con MIXHOR PLUS, MULTIFRUT y HARD-TOG.

Tomate, Pimiento, Ají, Paprika	1 L	2 L	Aplicarlo cada 10 a 15 días.	Antes de la floración combinarlo con MIXHOR PLUS más MULTIFRUT. Después de la floración combinar MIXHOR PLUS más HARD-TOG más MULTIFRUT.
Café	1 L	2 L - 3 L	1ra. Aplicación antes de la floración. 2da. Aplicación cuando se está formando el cerezo.	Combinarlo con MULTIFRUT.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

VITAL-W MAGNESIO debe aplicarse en la etapa de pleno crecimiento de los cultivos a fin de reforzar la capacidad fotosintética de los mismos.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA

Se recomienda no ingresar a las áreas tratadas hasta 4 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

VITAL-W MAGNESIO no es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Ligeramente Peligroso.

Rev. 02-02-26